

Cas CIRRNET : ID 139768

Quick-Info : « Double prescription lors du changement de l'insuline de base »
11.08.2026

Cas similaires de la banque de données CIRRNET :

« Double prescription pour les médicaments de réserve. Le personnel de soins d'urgence a prescrit du paracétamol 1 g max. 4 fois par jour, dans les réserves. Le médecin de garde a visé cela, mais a tout de même prescrit une nouvelle fois du Dafalgan 500 mg, max. 4 fois par jour, et en plus à heures fixes 4 fois par jour. Selon cette ordonnance, le patient peut prendre au total 8 g de Dafalgan par jour. »

« Un médicament qui devrait être interrompu n'a pas été suspendu. En même temps, un générique a cependant été prescrit. C'est pourquoi la patiente a reçu une double dose. »

« Le patient a pris 1 comprimé de pantoprazole 40 mg à la maison le matin et a reçu en plus 1 comprimé de Nexium 40 mg lors de son admission en salle de réveil. Nexium a été prescrit par l'anesthésiste. Les médicaments personnels ont été inscrits dans le dossier et marqués avec la mention (pris à la maison). »

« Un anticoagulant propre au patient est prescrit. Selon l'ordonnance, il doit également être administré le jour de l'opération ou le premier jour postopératoire, bien que le début de l'anticoagulation orale soit généralement prévu au 4^e jour postopératoire, elle devrait donc être suspendue dans le système. De plus, Xarelto a été prescrit deux fois (médicament personnel du patient et dans l'ordonnance collective de l'opérateur). »

« Le client nous remet la nouvelle liste de médicaments après son rendez-vous chez son médecin traitant. Le lévétiracétam est administré deux fois, à des dosages différents, 500 mg et 1000 mg. J'ai vérifié auprès du médecin généraliste s'il avait par erreur inscrit le médicament deux fois, ce qu'il a confirmé. Même après cet incident, la liste des médicaments n'a pas été mise à jour et nous avons de nouveau reçu la liste des médicaments avec les deux dosages. Ce n'est qu'ensuite que nous avons reçu une liste des médicaments correcte. »

« Fragmin et Xarelto ont été prescrits tous les deux le 4^e jour postopératoire. Ainsi, la prescription pour Fragmin et Xarelto est en cours simultanément. Lors du double contrôle avant l'administration du médicament, je me suis rendu compte que, conformément à l'ordonnance, les deux médicaments devaient être administrés. Après avoir consulté une collègue expérimentée, on m'a dit qu'il ne faut pas administrer les deux médicaments et que l'ordonnance devait être arrêtée par mes soins. »

« La patiente a été admise en soins postopératoires le 30 décembre. Du Clexane 40 mg a déjà été prescrit par l'infirmier·ère remplaçant·e. La patiente a été opérée le 31 décembre. En raison des prescriptions postopératoires, Clexane 40 mg a été prescrit par erreur deux fois (1 x par l'infirmier·ère remplaçant·e et une fois par l'ordonnance postopératoire). »

« Le patient était déjà sous anticoagulation préopératoire avec Eliquis. Cela est noté dans le dossier des médicaments avec la mention « en pause ». Selon l'ordonnance standard, Xarelto est prescrit à partir du 4^e jour postopératoire, ce qui entraîne la prescription de deux anticoagulants. »