

Caso CIRRNET: ID 139768

Quick-Info: «Doppia prescrizione nel passaggio dall'insulina basale»

11.08.2026

Casi comparabili dalla banca dati CIRRNET:

«Doppia prescrizione per i farmaci di riserva. Il personale addetto alle cure urgenti ha prescritto il paracetamolo 1 g max. 4 volte al giorno nelle riserve. Il medico di guardia lo ha vistato e tuttavia ha prescritto di nuovo Dafalgan 500 mg max. 4 volte al giorno e anche FIX 4 volte al giorno. In totale, secondo questa prescrizione, il paziente potrebbe assumere 8 g di Dafalgan al giorno.»

«Un farmaco che doveva essere sospeso non è stato interrotto. Allo stesso tempo, però, è stato prescritto un farmaco generico. Per questo motivo la paziente ha ricevuto una dose doppia.»

«Al mattino il paziente ha preso a casa 1 compressa di pantoprazolo 40 mg e in aggiunta 1 compressa di Nexium 40 mg in sala risveglio. Il Nexium era prescritto dal personale di anestesia. I farmaci personali sono stati inseriti nella curva e contrassegnati con l'indicazione "assunti a casa".»

«Prescritti anticoagulanti propri del paziente, secondo la prescrizione dovrebbero anche essere somministrati il giorno dell'intervento / il 1° giorno del post-operatorio anche se l'inizio dell'anticoagulazione orale avviene solitamente solo al 4° giorno post-operatorio, dovrebbe quindi essere sospeso nel sistema, inoltre Xarelto è prescritto due volte (nella prescrizione del paziente e in quella cumulativa dell'operatore).»

«Dopo l'appuntamento dal medico di famiglia, il cliente ci consegna la nuova lista di farmaci. Il levetiracetam compare in due dosi diverse, 500 mg e 1000 mg. È stato chiesto al medico di famiglia se avesse elencato il farmaco due volte per sbaglio, cosa che ha confermato. Anche dopo tale evento la lista dei farmaci non è stata aggiornata e l'abbiamo ricevuta nuovamente con entrambi i dosaggi. Solo in seguito abbiamo ricevuto una lista dei farmaci corretta.»

«Fragmin e Xarelto sono prescritti entrambi al 4° giorno post-operatorio. Pertanto, la prescrizione per Fragmin e Xarelto è valida contemporaneamente. Durante il doppio controllo prima di somministrare il farmaco, ho notato che secondo la prescrizione andrebbero somministrati entrambi. Dopo aver consultato una collaboratrice di lunga data, mi è stato detto di non somministrare entrambi i farmaci e di interrompere la prescrizione personalmente.»

«La paziente è stata ricoverata la notte del 30 dicembre. Era già stato prescritto un Clexane 40 mg dal pronto soccorso. Il 31 dicembre la paziente è stata operata. Nelle prescrizioni post-operatorie sono stati erroneamente prescritti 2 Clexane 40 mg (1 dal pronto soccorso e 1 post-operazione).»

«Il paziente era già stato sottoposto a terapia anticoagulante preoperatoria con Eliquis. Questo riporta l'annotazione «sospeso» nella curva dei farmaci. Come prescrizione standard, Xarelto viene prescritto a partire dal 4° giorno post-operatorio, quindi sono stati prescritti due anticoagulanti.»