



5 ans

Otite moyenne (otitis media)

Chez le pédiatre

Les otites moyennes sont fréquentes chez les enfants ; elles sont une cause importante de consultation. Imaginons une maman ou un papa qui se rend chez le pédiatre avec sa fille de 5 ans.

De quoi dépend un traitement sûr

Voici une sélection des risques pour la sécurité des patients. Un « bon traitement » comprend d'autres aspects importants.

Prendre la bonne décision thérapeutique ensemble : éviter les prescriptions d'antibiotiques inutiles

Prescrire des médicaments adaptés au poids actuel

Manipuler et administrer correctement les médicaments prescrits.

Des préjudices peuvent être occasionnés

Des analyses américaines montrent que 29 % des prescriptions d'antibiotiques en ambulatoire pour des enfants et adolescents sont potentiellement inutiles.¹

Une étude américaine montre que 74 erreurs de médication sont commises pour 100 prescriptions pédiatriques rédigées en cabinet.²

40 % des parents se trompent en mesurant les doses de médicaments liquides, d'après une étude américaine.³



Infections (5 ans)



Comment rendre le traitement sûr

Diverses activités et mesures augmentent la sécurité des patients. Nous vous montrons des **exemples de mesures** qui diminuent le risque de préjudice dans cette situation.

1

Prendre des décisions éclairées

Bien informer les parents peut augmenter l'acceptation de la (non-)prescription et favoriser l'emploi correct d'antibiotiques. L'OFSP a publié du matériel à cet effet.

→ antibiotika-richtig-einsetzen.ch/fr

→ quand-il-faut-comme-il-faut.ch/humain (OFSP)



2

Une prescription correcte

- Eviter les erreurs de conversion : utiliser les recommandations posologiques et les outils techniques de conversion
- Tenir compte du poids actuel de l'enfant

→ swisspeddose.ch/fr, → pedeus.ch/en



3

Informez et éduquez les parents de façon compréhensible

La méthode Teach back permet de s'assurer que les parents savent bien doser et administrer les médicaments : une fois informés et éduqués, ils répètent les informations avec leurs propres mots. Cela permet d'identifier les ambiguïtés et de répéter les instructions si nécessaire.

→ allianz-gesundheitskompetenz.ch/fr/publications



4

Donner des outils de dosage adaptés aux parents

- Le dosage correct de médicaments liquides est facilité lorsque l'outil de dosage (p. ex. une seringue) contient un volume semblable à la dose prescrite. Les surdoses et les erreurs dues à des mesures répétées sont ainsi évitées.⁴
- L'équipe du cabinet peut dissoudre le sirop et expliquer son emploi et son stockage aux parents. Dissoudre soi-même un sirop peut mener un mauvais dosage.
- Le personnel peut aussi montrer aux parents ce qu'est p. ex. une dose de 6,2 ml, à l'aide d'une seringue vide.

1 Fleming-Dutra KE, et al. (2016) doi:10.1001/jama.2016.4151

2 Kaushal R, et al. (2010) doi:10.1136/qshc.2008.031179

3 Yin HS, et al. (2014) doi:10.1542/peds.2014-0395

4 Yin HS, et al. (2017) doi:10.1542/peds.2016-3237