

# SONDAGE VÉSICAL



## INDICATIONS

### Rétention urinaire

- rétention urinaire
- obstruction chronique symptomatique  
**PLUS** > 300 ml d'urine résiduelle

### Bilan urinaire

- à intervalles courts et réguliers **PLUS** avec conséquences thérapeutiques directes résultant du bilan urinaire

### Opération

- durée de l'opération > 4 h
- péri-opératoire : pour des raisons techniques
- chirurgie uro-génitale et/ou chirurgie du plancher pelvien
- anesthésie/analgésie épidurale/péridurale

### Escarre **PLUS** incontinence

- décubitus de stade III ou IV ou greffe cutanée sacrale/périnéale **PLUS** incontinence\*

### Immobilisation prolongée

- immobilisation pour des raisons médicales\*, en particulier dans le but de diminuer les douleurs

### Soins palliatifs **PLUS** confort

- phase palliative terminale **PLUS** perturbation de la fonction urinaire **PLUS/OU** difficulté/impossibilité d'avoir une miction normale\*
- en cas de grande souffrance **PLUS** sur demande du patient dûment informé

\* après épuisement de toutes les autres méthodes d'évacuation de l'urine

## NE PAS UTILISER DE SONDE DANS LES CAS SUIVANTS :

- rétention urinaire chronique asymptomatique
- bilan urinaire pour les patients stables qui peuvent être pesés quotidiennement
- dépendance des soins intensifs
- incontinence
- immobilisation jusqu'à épuisement de toutes les méthodes alternatives d'évacuation de l'urine
- confort du point de vue du patient ou de sa personne de confiance **OU** du point de vue du personnel soignant



Plus rare




Plus court



Plus sûr

## FLOWCHART



sécurité des patients suisse

swissnoso

[www.securitedespatients.ch](http://www.securitedespatients.ch) | [www.swissnoso.ch](http://www.swissnoso.ch)

Référencer : Publication avec update N° 9, Sécurité des patients Suisse

ISBN 3-905803-22-4