

CATETERISMO VESCICALE



INDICAZIONI

ritenzione urinaria

- ritenzione urinaria acuta
- ostruzione del flusso in uscita sintomatica e cronica **PIÙ** > 300 ml urina residua

monitoraggio/ bilancio urinario

- a intervalli regolari e brevi **PIÙ** conseguenze terapeutiche dirette del bilancio

intervento chirurgico

- durata dell'intervento chirurgico > 4 h
- peri-operatorio: per motivi correlati alla tecnica chirurgica
- chirurgia urogenitale e/o chirurgia del pavimento pelvico
- anestesia/analgesia epidurale/peridurale

ulcera da decubito **PIÙ** incontinenza

- decubito di grado III o IV o trapianto di pelle sacrale/perineale **PIÙ** incontinenza*

immobilizzazione prolungata

- immobilizzazione per motivi medici*, in particolare per la riduzione del dolore

palliativo **PIÙ** comfort


- situazione palliativa terminale **PIÙ** disturbo della funzione vescicale **PIÙ/OPPURRE** difficoltà/impossibilità di una minzione normale*
- nei casi di forte sofferenza **PIÙ** il desiderio del paziente informato

* dopo l'esaurimento di metodi alternativi preposti al drenaggio controllato dell'urina

NESSUN CATETERE CON ...

- ritenzione urinaria asintomatica e cronica
- monitoraggio dell'urina/bilanciamento dei liquidi nel caso di pazienti stabili per cui è possibile un controllo del peso giornaliero
- cura intensiva-stato di bisogno
- incontinenza
- immobilizzazione, fino a che non sono stati esauriti metodi alternativi preposti al drenaggio controllato dell'urina
- comfort dal punto di vista del paziente o del suo rappresentante terapeutico **OPPURE** del personale

FLOWCHART



Minor
frequenza



Minore
durata



Maggior
sicurezza



sicurezza dei pazienti svizzera

swissnoso

www.sicurezzaideipazienti.ch | www.swissnoso.ch

Riferimento: Pubblicazione con update N° 9, Sicurezza dei pazienti Svizzera

ISBN 3-905803-23-2